

Aus den Medizinischen Kliniken und Polikliniken
der Justus Liebig-Universität Gießen
Direktoren: Prof. Dr. H. J. Dengler, Prof. Dr. H. G. Lasch

Untersuchungen
zur Methode der Chinidinbestimmung
in Plasma, Blut und Kapillarblut

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades
des Bereichs Humanmedizin
der Justus Liebig-Universität Gießen

vorgelegt von
Klaus Wolfgang Dieterich
aus Stuttgart

Gießen 1973



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41545932_0046

Aus den Medizinischen Kliniken und Polikliniken
der Justus Liebig-Universität Gießen
Direktoren: Prof. Dr. H. J. Dengler, Prof. Dr. H. G. Lasch

Untersuchungen
zur Methode der Chinidinbestimmung
in Plasma, Blut und Kapillarblut

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades
des Bereichs Humanmedizin
der Justus Liebig-Universität Gießen

vorgelegt von
Klaus Wolfgang Dieterich
aus Stuttgart

Gießen 1973



- Dekan: Prof. Dr. H. J. Staudinger
1. Berichterstatter: Prof. Dr. H. J. Dengler
2. Berichterstatter: Prof. Dr. H. W. Rautenburg
3. Berichterstatter: Prof. Dr. G. Szasz

Meiner Mutter
in Dankbarkeit

Gliederung

A. Einleitung: Chinidin	Seite
I. Allgemeines	1
II. Pharmakologie	3
III. Nebenwirkungen	4
IV. Kontraindikationen	4
V. Darreichungsformen	5
VI. Fragestellung	6
B. Methodik	
I. Reagenzien	8
II. Erstellung einer Fickkurve	9
III. Technik der Bestimmungsmethode	9
IV. Zuverlässigkeit (reliability) der Methode	12
C. Hauptversuche	
I. Versuchsanordnung	17
II. Ergebnisse	
a.) Konzentrationen in Plasma, Blut und Kapillarblut nach Einnahme von Chinidin Duriles ^(r)	19
b.) Konzentrationen in Plasma, Blut und Kapillarblut nach Einnahme von Chinidinum purum Buchler ^(R)	21
c.) Vergleich der 6-Stundenwerte nach Einnahme von Chinidin Duriles ^(r) und Chinidinum purum Buchler ^(R)	23
d.) Vergleich der 6-Stundenwerte mit den jeweiligen Maximalwerten nach Einnahme von Chinidin Duriles ^(r)	25
e.) Vergleich der 6-Stundenwerte mit den jeweiligen Maximalwerten nach Einnahme von Chinidinum purum Buchler ^(R)	28
f.) Parameter der BATEMAN-Funktion bei 2 Patienten der Chinidinum-purum-Serie	30

D. Darstellung und Besprechung der Ergebnisse	33
E. Zusammenfassung	36
F. Tabellen	37
G. Literaturverzeichnis	62

A. Einleitung : Chinidin

I. Allgemeines


Die Gruppe der China-Alkaloide umfaßt ca. 30 verschiedene, zum Teil stereoisomere Pflanzenbasen, die aus der Rinde und den Wurzeln subtropischer Bäume der Gattungen Cinchona und Renijia, beides Rubiaceen Arten, isoliert werden können.

Seit etwa 1630 war die Chinarinde ein gesuchtes Fiebermittel. Heute wird Cortex Chinae noch als Stomachicum verwendet.

Von PELLETIER und CAVENTOU wurde 1820 das Chinin entdeckt, das mit Chinidin stereoisomer ist. Das rechtsdrehende Chinidin wurde 1853 von PASTEUR isoliert.

Um die Konstitutionsaufklärung der China-Alkaloide haben sich besonders KOENIGS, STRAMP und P. RABE (P. RABE, Synthese des Dihydrochinins, 1931) verdient gemacht.

Chinidin ist mit Chinin stereoisomer, und hat folgende Strukturformel:



Chinuclidinring

Chinolinkern

Das Chinidin unterscheidet sich vom Chinin am asymmetrischen C-Atom (3).

Es besitzt 4 asymmetrische C-Atome (siehe obige Formel 1, 2, 3 und 4). Der Aufbau des Chinidinmoleküls besteht aus zwei verschiedenen Ringsystemen: dem Chinolinkern und einem sogenannten Chinuclidinring. An den Chinuclidinring ist die antiarrhythmische Wirkung gebunden.

1914 beschrieb WENCKEBACH die antiarrhythmische Wirkung von Chinin.

1918 stellte FREY fest, daß Chinidin wesentlich stärker antiarrhythmisch wirkt als Chinin. Seither wird die antiarrhythmische Wirkung von Chinidin therapeutisch genutzt.

II. Pharmakologie:

Wirkung am Herzmuskel: Chinidin vermindert den Kaliumefflux während der Repolarisationsphase und hat dadurch einen membranstabilisierenden Effekt (HOLLAND, 1957; ARMITAGE, 1957). Die Wirkung kommt durch Bindung des Chinidins an die Membranlipoproteide zustande (CONN und LUCHI, 1961).

Die relative Refraktärzeit wird verlängert (VAUGHAN-WILLIAMS, 1958). Die Leitungsgeschwindigkeit in Vorhof und Kammer wird vermindert (SOKOLOV, 1951). Die Reizbarkeit wird herabgesetzt (DAWPS, 1946; WEIDMANN, 1955). Die Kontraktionsamplitude wird verkleinert (HOLLAND, 1957). Der Vagustonus nimmt ab (HIATT, 1945) und es kommt zu einer "Vasodepression" (FERRER und andere, 1948).

Die Wirkung auf die Leitungsgeschwindigkeit und auf die Reizbarkeit bewirken in der Hauptsache den antiarrhythmischen Effekt des Chinidins.

III. Nebenwirkungen:

Kardial: QPS-Verbreiterung bis zum Schenkelblock, AV-Überleitungsstörung bis zum AV-Block und Asystolie, ventrikuläre Extrasystolen, Kammertachycardien bis zum Kammerflattern oder -flimmern. Blutdruckabfall.

ZNS: Verschlechterung des Hörvermögens, Ohrensausen, Beeinträchtigung des Sehvermögens, Verwirrungszustände, Gleichgewichtsstörungen und Tremor.

Magen-Darmtrakt: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Abdominalkrämpfe. Diese Erscheinungen beruhen hauptsächlich auf der lokalen Reizwirkung des Chinidins auf die Schleimhäute.

IV. Kontraindikationen:

Chinidinidiosynkrasie oder -Überempfindlichkeit (sehr selten). Es kommt dabei zu Kollaps, Koma und Konvulsionen. Außerdem wurden beobachtet: Urticaria, Quincke'sches Ödem, Purpura und Asthma, Thrombozytopenien sowie Fieber. Es sollte daher jede Chinidin Therapie mit einer Testdosis von 0,2 g begonnen werden.

Bei ausgeprägter Herzinsuffizienz oder Myokarditis (negativ-ionotrope Wirkung!), partiellen oder kompletten Schenkelblockbildern sowie bei einer Hypokaliämie (K 3,5 mval/L) verbietet sich eine Therapie mit Chinidin.

Die Toxizität hängt mehr mit der Höhe des Serumspiegels als mit der individuellen Chinidindosis zusammen (SOKOLOV, 1950), d.h. die Korrelation

zwischen Dosis und toxischen Komplikationen ist gering, genauer ist die Korrelation zwischen Serumspiegel und toxischer Myocardwirkung.

Gefährliche toxische Reaktionen wurden bei einem Serumspiegel von $6 \mu\text{g/ml}$ in 1 %, bei 8 - $10 \mu\text{g/ml}$ in 30 %, und bei Serumspiegel über $14 \mu\text{g/ml}$ sogar mit 65 % angegeben (SOKOLOW, 1950 und 1956).

Bei einer Chinidinthherapie, besonders bei Tagesdosen über 1,5 g, sollte daher neben der Beobachtung des Serumspiegels vor jeder Dosissteigerung ein EKG angefertigt werden. Außerdem sollte Kalium im Serum bestimmt werden. Die Dosis muß reduziert werden, bzw. die Therapie abgebrochen werden, wenn der QRS-Komplex um mehr als 25 % verbreitert ist, gekoppelte Kammerextrasystolen, oder ein AV-Knotenrhythmus auftritt. Ebenso empfiehlt sich ein Abbruch der Therapie bei Auftreten von Vorhofflattern mit 2:1 Überleitungsblock und hoher Kammerfrequenz (über 120/min).

Häufige Blutdruck- und Pulskontrollen sind selbstverständlich.

Heute wird Chinidin am häufigsten nach erfolgreicher Defibrillation durch Elektroschock bei Vorhofflimmern verwendet, um den erzwungenen Sinusrhythmus aufrecht zu erhalten. Außerdem wird es mit Vorsicht bei Vorhofflattern eingesetzt. Ferner zur Prophylaxe und Behandlung von paroxysmaler Tachycardie, sowie verschiedenen Formen von Extrasystolen.

V. Darreichungsformen:

1. Chinidinum purum- und sulfuricum-Präparate.

Vorteil: rasche Abklingquote, daher zur Neueinstellung geeignet.

Nachteil: Einnahme in 2 - 4 stdl. Abstand erforderlich,

da die Halbwertszeit des Chinidins im Organismus ca. zwei Stunden beträgt (CONN, 1964).

2. Chinidin-Duriles^(v), ein Depot-Präparat.

In ein poröses, unlösliches Poly-vinylchloridgerüst in Tablettenform sind 0,25 g Chinidin bisulfuricum = 0,2 g Chinidinsulfat eingebettet. Diese Tablette gibt in vitro 40% der gesamten Dosis in der ersten Stunde, den Rest gleichmäßig über 8 Stunden ab (SJÖGREN, 1960). Diese Form wird heute fast ausschließlich zur Dauertherapie eingesetzt.

Es wurden nun von verschiedenen Autoren immer wieder die Höhe der Chinidin Plasmaspiegel nach Einnahme von Chinidin-Präparaten bestimmt. Es sollte dadurch geklärt werden bei welchen Konzentrationen Rezidive, bzw. Nebenwirkungen auftreten (CRAMER et al., 1963; SIITONEN, 1964; CULLHED et al., 1966).

Auch heute interessiert diese Frage immer noch, besonders beim Auftreten von Nebenwirkungen und Rezidiven.

VI. Fragestellung:

In der vorliegenden Arbeit sollte gezeigt werden, ob die von den meisten Autoren gewählte Bestimmungsmethode: Doppelextraktionsmethode nach BRODIE und UDENFRIED in einer Modifikation von CRAMER und ISAKSSON zur quantitativen Bestimmung von Chinidin im Serum, geeignet ist, Chinidin auch aus Blut zu bestimmen.

Zweitens sollte gezeigt werden, ob die Methode geeignet ist, die Bestimmung in 0,2 ml Kapillarblut durchzuführen.

Drittens sollten die Chinidinspiegel im Plasma, Venen-

blut sowie Kapillarblut nach Einnahme von Chinidinum purum Präparaten, verglichen werden mit den Serumspiegeln nach Einnahme des Depotpräparates Chinidin-Duriles (R).

B. Methodik

Die quantitative Bestimmung von Chinidin beruht auf seiner Fähigkeit in saurer Lösung zu fluoreszieren. Die grundlegenden Prinzipien für die Extraktion und die quantitative Bestimmung fluoreszierender organischer Basen aus biologischem Material wurden hauptsächlich von BRODIE (1947), und UDENFRIED et al. (1947) erarbeitet.

Auf diesen Prinzipien beruht auch die von uns gewählte Doppelextraktionsmethode von BRODIE und UDENFRIED et al. (1947) in der Modifikation von CRAMER und ISAKSSON (1963) zur Bestimmung von Chinidin aus Plasma.

I. Reagenzien:

Es dürfen nur Reagenzien "pro Analyti" verwendet werden.

1. Chinidinum purum wasserfrei
 $C_{20}H_{24}O_2N_2$ Mol.Gew.: 324,43
Schmelzpunkt Literatur: 172°
Schmelzpunkt gefunden: 171°
2. Benzol "Merck" redestilliert und fluoreszenzfrei.
3. Natronlauge 0,1 n "pro Analyti Merck".
4. Natronlauge 1 n "pro Analyti Merck".
5. Schwefelsäure 0,1 n "pro Analyti Merck".
6. Natriumoxalat "Merck".

II. Erstellung einer Eichkurve:

Zunächst wurde eine Stammlösung hergestellt. Dazu wurden 100,0 mg Chinidinum purum in 0,1 n Schwefelsäure ad 1 000,0 aufgelöst. Diese Stammlösung ist mehrere Monate im Eisschrank haltbar.

Aus dieser Stammlösung wurde eine Verdünnungsreihe hergestellt, mit Konzentrationen von 0,001 $\mu\text{g/ml}$ bis 10 $\mu\text{g/ml}$.

Die Fluoreszenz der einzelnen Konzentrationen wurde im Aminco-Bowmann-Spectrofluorimeter bei einer Anregung von 340 nm und einer Fluoreszenz von 450 nm gemessen.

Bei den Konzentrationen von 0,01 $\mu\text{g/ml}$ bis 10 $\mu\text{g/ml}$ ergab sich eine strenge Linearität zwischen Konzentration und den am Aminco-Bowmann-Spectrofluorimeter abgelesenen Skalenteile (siehe Tabellen). Im Bereich von 0,001 $\mu\text{g/ml}$ - 0,01 $\mu\text{g/ml}$ war die Linearität nicht mehr gegeben. Dieser Konzentrationsbereich spielte in den Hauptversuchen keine Rolle.

Siehe Tabellen Seite 38, sowie graphische Darstellung Seite 42 bis 44.

III. Technik der Bestimmungsmethode:

1. In zwei Glasstopfengläschen (30 ml) mit eingeschliffenen Glasstopfen, die je 1 ml 0,1 n - Natronlauge enthielten wurden tropfenweise unter Umschwenken je 0,5 ml Plasma, bzw. 0,5 ml Blut gegeben.
Anschließend wurde in jedes Gläschen 7,5 ml Benzol zugegeben.

2. Die Gläschen wurden 5 Minuten lang kräftig geschüttelt, danach 10 Minuten mit der Laborzentrifuge (ca. 3 000 Upm) zentrifugiert.

3. 5 ml des klaren Benzolextraktes wurden in je zwei neue 30 ml Glasstopfengläschen übertragen, die je 5,0 ml 0,1 n Schwefelsäure enthielten.

4. Die Gläschen wurden 5 Minuten lang kräftig geschüttelt, und danach 10 Minuten lang zentrifugiert.

5. Nach Absaugen der oberen Benzolphase wurde der Schwefelsäureextrakt mittels einer Pipette in eine Glasküvette (Fa. Ellma) übertragen.

6. Die schwefelsaure Lösung wurde im Aminco-Bowmann-Spektrofluorimeter bei folgenden Wellenlängen gemessen: Anregung 340 nm, Fluoreszenz 450 nm.

Die Maxima der Anregungs- und Fluoreszenzspektren wurden vor den Versuchen ermittelt. Es wurde der Messbereich aufgesucht bei dem ein bestimmter Chinidin-Standard in 0,1 n Schwefelsäure den größten Ausschlag am Messgerät anzeigte. Diese Einstellung (Anregung 340 nm, Fluoreszenz 450 nm) wurde für alle weiteren Messungen konstant eingehalten.

Für die Bestimmungen aus 0,5 ml Blut sowie 0,2 ml Blut wurden in den entsprechenden Gläschen vor Einbringen des Blutes, 0,5 bzw. 0,2 ml 10% Natriumoxalatlösung verdampft. Das an der Wand anhaftende feinkristalline Oxalat wurde durch vorsichtiges Schwenken gelöst und dadurch eine Gerinnung verhindert. Anschließend wurde die Natronlauge zugesetzt. Der übrige Gang war der oben beschriebenen Methode völlig analog.

Bei der Bestimmung aus 0,2 ml Kapillarblut wurden zu dem ungerinnbar gemachten Blut (s. oben), 0,5 ml 0,1 n - Natronlauge zugesetzt, danach 3,0 ml Benzol. 2,0 ml der Benzolphase wurden mit 2,0 ml 0,1 n - Schwefelsäure ausgeschüttelt. Die chinidinhaltige Schwefelsäure zur Messung gebracht. Plasma wurde durch unmittelbares Zentrifugieren nach der Blutentnahme gewonnen.

Um die individuellen Schwankungen der Eigenfluoreszenz von Plasma- bzw. Blutproben verschiedener Versuchspersonen auszugleichen wurde mit einem sogenannten "inneren Standard" gearbeitet.

Dabei wurden bei den Hauptversuchen von jeder Versuchsperson jeweils drei Plasma- bzw. Blutproben gemessen, denen 0,5 µg Chinidin, enthalten in 0,5 ml 0,1 n - Schwefelsäure, bzw. 0,2 µg Chinidin enthalten in 0,2 ml 0,1 n Schwefelsäure zugesetzt wurde. Die zugefügte Schwefelsäure wurde anschließend durch 2 Tropfen 1 n - Natronlauge, bzw. durch 1 Tropfen 1 n - Natronlauge neutralisiert. Danach wurden diese Proben nach den unter 1 - 5 gezeigten Anweisungen behandelt. Die parallel laufende Bestimmung, zum gleichen Zeitpunkt abgenommene Blut- bzw. Plasmaproben, enthielten demnach 0,5 µg bzw. 0,2 µg weniger Chinidin, als die Proben mit innerem Standard.

Darauf beruhte die rechnerische Umrechnung von den am Amico-Rowmann abgelesenen Skalenteilen zu den realen Chinidinkonzentrationen.

IV. Kommentare und Beurteilung der Methode.

1. Reinigung der Geräte

Alle Geräte wurden vor jeder Bestimmung zunächst mechanisch mit Bürste und Spülmittel (Fril) gereinigt, anschließend für 4 - 6 Stunden in ein Dichromatschwefelsäurebad gebracht. Dadurch wurden alle Substanzen mit Interferenzwirkung sowie fluoreszierende Verunreinigungen beseitigt. Nach dem Dichromatschwefelsäurebad wurden alle Geräte 5mal mit Wasser, dann 3mal mit Aqua dest. und schließlich 2mal mit Aqua bidest. gespült. Bei einer weniger gründlichen Reinigung waren z.T. größere Schwankungen gefunden worden.

Bei allen hier aufgeführten Messungen wurden die Geräte in der oben geschilderten Art gereinigt.

2. Spezifität der Methode

Die Spezifität der Methode wurde durch Dünnschichtchromatographie überprüft. Mehrere Proben von schwefelsauren Extrakten, gewonnen nach oben beschriebenem Verfahren aus Plasma und Blut von mit Chinidin behandelten Personen, und reines Chinidin in schwefelsaurer Lösung wurden aufgetragen und nach der Entwicklung im UV-Licht betrachtet. Beim Vergleich fand sich nur ein fluoreszierender Fleck, der dem R_f -Wert des Chinidins entsprach.

3. Richtigkeit der Methode

Praktisches Vorgehen (Zusatzversuche)

Plasma bzw. Oxalatblut (wie oben beschrieben) wurden bestimmte Mengen Chinidin in 0,1 n - schwefelsaurer Lösung zugesetzt, anschließend wurde 6 Std. bei 37°C inkubiert. Die durch die Schwefelsäure entstandene Säuerung wurde zuvor durch äquivalente Mengen 1 n - Natron-

lauge ausgeglichen. Die so gewonnenen Proben wurden wie oben beschrieben gemessen. Zur Erlangung der Leerwerte wurden vom gleichen Plasma bzw. Blut gleiche Mengen ohne Chinidinzusatz mit Schwefelsäure und Natronlauge behandelt, und die Extraktionsmethode durchgeführt.

Die gewonnenen Messwerte wurden nach Abzug der Leerwerte in Beziehung gesetzt zu Messwerten die von schwefelsauren Chinidinlösungen stammten, die eine bekannte Chinidinkonzentration enthielten. Alle Bestimmungen wurden doppelt durchgeführt, der jeweilige Mittelwert zur Berechnung verwendet.

Um eine möglichst vollständige Recovery zu erhalten, mußte das Verhältnis zwischen organischer und anorganischer Phase über 3:1 liegen. Das Verhältnis zwischen Benzol und Schwefelsäure war weniger wichtig, um eine vollständige Reextraktion zu erhalten, mußte es unter 15:1 liegen.

Ergebnisse

Beispiel eines Versuches

0,5 ml Plasma enthielten eine Ausgangskonzentration von $\frac{5}{3} \mu\text{g/ml}$ Chinidin. Durch Verdünnungsvorgänge bei der Extraktionsmethode gelangte $\frac{1}{15}$ der Ausgangskonzentration theoretisch zur Messung. Im Beispiel

$$\frac{5}{3} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{9} \mu\text{g/ml} = 100 \%$$

Die erhaltene Meßlösung wurde in Beziehung gesetzt mit einer schwefelsauren Lösung, die 0,1 µg/ml Chinidin enthielt.

Nach Abzug der Leerwerte für Plasma nach Behandlung durch die Extraktionsmethode wurden folgende Werte erhalten:

0,1 µg/ml Chinidin in 0,1 H₂SO₄ ergaben 67,8 ST

Die durch den Extraktionsvorgang erhaltene
Messlösung ergab 68,3 ST

Es galt also:

$$x \text{ µg/ml Chinidin} = \frac{68,3 \times 0,1}{67,8} = 0,1007 \text{ µg/ml}$$

$$\frac{1}{9} \text{ µg/ml} = 100 \%$$

$$0,1007 \text{ µg/ml} = x \% \quad x = \frac{0,1007 \times 100 \times 9}{1} = 90,03 \%$$

In jeweils 4 Rückgewinnungsversuchen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

a) Recovery aus 0,5 ml Plasma:

Zugegebene Menge	Zurückgewonnene M.	Rückgew. %
1,6... µg/ml	1,5 µg/ml	90,0
10,0 µg/ml	9,0 µg/ml	90,0
16,6... µg/ml	16,25µg/ml	97,5
25,0 µg/ml	25,07µg/ml	100,3

Im Mittel wurden 94,4 % (90 - 100,3 %) zurückgewonnen.

b) Recovery aus 0,5 ml Blut:

Zugegebene Menge	Zurückgewonnene M.	Rückgew. %
1,6... µg/ml	1,73 µg/ml	103,9
16,6... µg/ml	13,45 µg/ml	80,7
20,0 µg/ml	16,58 µg/ml	82,9
28,5 µg/ml	22,20 µg/ml	77,7

Im Mittel wurden 86,3 % (77,7 - 103,9) zurückgewonnen.

c) Recovery aus 0,2 ml Kapillarblut:

Zugegebene Menge	Zurückgewonnene M.	Rückgew. %
4,0 µg/ml	3,62 µg/ml	90,5
10,0 µg/ml	9,74 µg/ml	97,4
20,0 µg/ml	19,72 µg/ml	98,6
40,0 µg/ml	41,76 µg/ml	104,4

Im Mittel wurden 97,7 % (90,5 - 104,4 %) zurückgewonnen.

4. Empfindlichkeit der Methode.

Siehe Anhang: zur Linearität der fluorimetrischen
Messwerte.

C. Hauptversuche

I. Versuchsanordnung

Bei den Hauptversuchen wurde sechs Patienten (im Folgenden als Patient 1 bis 6 bezeichnet) 10 mg Chinidinbisulfat pro Kilogramm Körpergewicht in Form von Chinidin-Duriles^(R), sechs weiteren Patienten (im Folgenden als Patient 7 bis 12 bezeichnet) äquivalente Dosen von Chinidinum purum, in Form von Chinidinum purum Buchler verabfolgt.

Die Dosis wurde jeweils unmittelbar nach einem Standardfrühstück, bestehend aus zwei Brötchen, 25,0 Butter, 50,0 Marmelade sowie zwei Tassen kliniküblichen Kaffees, verabfolgt. Vierundzwanzig Stunden vor dem Versuch erhielten alle Patienten eine einmalige Testdosis Chinidin purum in Form von einer Tablette Chinidinum purum Buchler^(R) gleich 0,2 g Chinidinum purum, um eine Idiosynkrasie gegen Chinidin auszuschließen.

Unmittelbar vor der Chinidineinnahme wurde allen Patienten Blut und Kapillarblut zur Bestimmung der Leerwerte im Plasma, Blut und Kapillarblut abgenommen. Um die genaue Dosis pro Kilogramm Körpergewicht verabfolgen zu können, mußte jeweils eine Tablette des Depotpräparates Chinidin Duriles^(R), sowie 1 Tabl. des Präparates Chinidinum purum Buchler^(R) zerkleinert werden.

Zuvor wurden fünf mal 10 Tabletten Chinidin Duriles^(R) sowie fünf mal 10 Tabletten Chinidinum purum Buchler^(R) auf der Analysenwaage abgewogen.

Zehn Tabletten Chinidinum Duriles^(R) wogen im Mittel 5,645 g und entsprachen 2,5 g Chinidinbisulfat.

Zehn Tabletten Chinidinum purum Buchler^(R) wogen im Mittel 4,7275 g und entsprachen 2,0 Chinidinum purum.

2,0 Chinidinum purum entsprechen 3,211 Chinidinbisulfat. Alle Patienten erhielten eine Dosis von 10 mg Chinidinbisulfat pro Kilogramm Körpergewicht beziehungsweise eine äquivalente Menge Chinidinum purum pro kg Körpergewicht, in Form von ganzen Tabletten und einem ergänzenden Bruchstück einer Tablette.

II. Ergebnisse

a.) Die Chinidinkonzentration in Plasma, Blut und Kapillarblut wurde nach der oben beschriebenen Methode bei Patient 1 bis 6 nach Einnahme von Chinidin Duriles^(R) bestimmt. Bei Patient 1 bis 4 nach 30, 60, 90, 120, 180 sowie nach 360 Minuten. Bei Patient 5 und 6 wurde außerdem die Konzentration nach 480 Minuten ermittelt.

Ergebnisse Seite 19

b.) Bei den Patienten 7 bis 12, die äquivalente Dosen Chinidinum purum Buchler^(T) eingenommen hatten, wurde bei Patient 7, 8 und 9 die Konzentration von Chinidin im Plasma, Blut und Kapillarblut nach 30, 60, 90, 120, 180 und 360 Minuten bestimmt, bei Patient 10, 11 und 12 zusätzlich die Konzentration nach 480 Minuten.

Ergebnisse Seite 21

Bei Patient 1 bis 6 ergaben sich nach Einnahme von 10 mg Chinidinbisulfat pro kg Körpergewicht in Form von Chinidin-Duriles^(R) folgende Werte:

Chinidinum Duriles (R)

Pat.	Zeit	µg/ml Plasma	µg/ml Blut	µg/ml Kapbl.
1	30'	0,00	0,00	0,00
	60'	0,70	0,67	1,45
	90'	0,92	0,82	2,15
	120'	0,96	1,21	1,90
	180'	1,04	1,26	2,05
	360'	1,46	1,62	4,10
2	30'	0,60	0,56	0,60
	60'	1,44	1,48	1,00
	90'	1,94	1,62	1,40
	120'	2,24	2,52	1,85
	180'	3,00	2,88	1,85
	360'	2,22	2,16	1,25
3	30'	0,16	0,017	0,41
	60'	0,53	0,24	1,05
	90'	0,78	0,58	0,86
	120'	0,56	0,62	1,08
	180'	2,35	0,67	1,40
	360'	1,77	0,76	1,15
4	30'	0,06	0,084	0,075
	60'	0,02	0,084	0,075
	90'	0,02	0,084	-
	120'	0,24	0,19	0,45
	180'	1,59	1,32	0,52
	360'	1,36	1,32	1,21
5	30'	0,27	0,66	0,84
	60'	0,87	0,93	2,00
	90'	1,34	1,61	1,81
	120'	1,44	1,22	1,31
	180'	1,13	1,19	1,15
	360'	1,01	1,15	1,17
	480'	0,77	0,88	0,68
6	30'	0,15	0,17	0,20
	60'	0,80	0,83	1,60
	90'	1,38	1,48	1,34
	120'	1,60	1,86	1,67
	180'	1,77	2,08	1,63
	360'	1,68	1,96	1,62
	480'	1,51	1,90	1,39

Bei Patient 7 bis 12 ergaben sich nach Einnahme von
äquivalenten Mengen Chinidinum purum = 10 mg Chinidinum
bisulfuricum pro kg Körpergewicht in Form von Chinidinum
sulfuricum folgende Werte:

Chinidinum purum Buchler (R)

Pat.	Zeit	µg/ml Plasma	µg/ml Blut	µg/ml Kapbl.
7	30'	0,00	0,09	0,06
	60'	1,03	0,00	1,40
	90'	2,38	1,55	3,10
	120'	2,74	2,80	3,50
	180'	4,15	3,88	5,06
	360'	3,18	2,88	2,68
8	30'	0,13	0,06	1,12
	60'	3,80	2,94	3,80
	90'	3,02	1,74	2,85
	120'	1,91	2,04	1,97
	180'	1,58	1,53	1,47
	360'	1,21	1,10	1,30
9	30'	0,00	0,00	0,00
	60'	0,00	0,00	0,00
	90'	0,18	0,10	0,16
	120'	0,62	0,30	0,61
	180'	1,88	1,11	2,17
	360'	2,41	1,61	2,50
10	30'	0,05	0,06	0,00
	60'	0,12	0,00	0,00
	90'	0,45	0,12	0,19
	120'	1,41	1,21	1,40
	180'	1,87	1,48	1,94
	360'	3,01	2,54	2,43
	480'	2,25	1,81	2,28
11	30'	0,07	0,09	0,00
	60'	1,01	0,68	1,11
	90'	3,24	2,27	3,00
	120'	4,09	2,44	3,25
	180'	3,30	2,55	3,30
	360'	1,97	1,28	1,72
	480'	1,44	1,20	1,02
12	30'	1,11	0,48	1,26
	60'	2,49	2,78	5,29
	90'	2,23	2,43	4,31
	120'	2,42	2,90	3,86
	180'	1,76	2,25	3,34
	360'	1,21	1,24	2,37
	480'	1,07	0,96	1,55

c.) Vergleich der 6-Stundenwerte.

Die Werte wurden aus 0,5 ml Plasma, 0,5 ml Blut und 0,2 ml Kapillarblut nach Einnahme von 10 mg Chinidinbisulfat pro kg Körpergewicht, in Form von Chinidin Duriles^(R) bei Pat. 1 bis 6, bei Patient 7 bis 12 nach Einnahme von Chinidinum purum Buchler^(R) entsprechend einer Dosis von 10 mg Chinidinbisulfat pro kg Körpergewicht gewonnen.

Sechs-Stundenwerte nach Einnahme von Chinidin-Duriles (R)

Patient	µg/ml Plasma	µg/ml Blut	µg/ml Kapillarbl.
1. ♀ 54 kg	1,46	1,62	-
2. ♂ 84 kg	2,22	2,16	1,25
3. ♀ 105 kg	1,77	0,76	1,15
4. ♀ 65 kg	1,36	1,32	1,21
5. ♂ 70 kg	1,01	1,15	1,17
6. ♂ 76 kg	1,68	1,96	1,62
Mittelwert	1,583	1,495	1,280
$\bar{x}$	0,409	0,521	0,192
S $\bar{x}$	0,167	0,212	0,085

Sechs-Stundenwerte nach Einnahme von Chinidinum purum Buchler (R)

Patient	µg/ml Plasma	µg/ml Blut	µg/ml Kapillarbl.
7. ♂ 84 kg	3,18	2,88	2,68
8. ♂ 69 kg	1,21	1,10	1,30
9. ♂ 79 kg	2,41	1,61	2,50
10. ♂ 70,5"	3,01	2,54	2,43
11. ♀ 62 kg	1,97	1,28	1,72
12. ♂ 70 kg	1,21	1,24	2,37
Mittelwert	2,165	1,775	2,166
$\bar{x}$	0,856	0,750	0,534
S $\bar{x}$	0,349	0,306	0,218

d.) Vergleich des 6-Stundenwertes mit dem Maximalwert bei 6 Patienten, die Chinidin Duriles^(R) = 10 mg Chinidinbisulfat pro kg Körpergewicht einnahmen, in $\mu\text{g/ml}$ Plasma, Blut und Kapillarblut. Patient 1 bis 6.

Sechs-Stundenwert zu Maximalwert nach Einnahme von Chinidin

Duriles (R) bei der Bestimmung aus Plasma.

Patient	6 Std.-Wert in $\mu\text{g/ml}$	Max.-Wert in $\mu\text{g/ml}$	$Q = \frac{6 \text{ Std.-Wert}}{\text{Max.-Wert}}$
1. ♀ 54 kg	1,46	1,46	1,00
2. ♂ 84 kg	2,20	3,00	0,74
3. ♀ 105 kg	1,77	2,35	0,753
4. ♀ 65 kg	1,36	1,59	0,855
5. ♂ 70 kg	1,01	1,44	0,701
6. ♂ 76 kg	1,68	1,77	0,949

Stat.
Berechnung

$\bar{x}$	1,58	1,93	0,83
S	0,40	0,62	0,12
$S \bar{x}$	0,16	0,25	0,04

Sechs-Stundenwert zu Maximalwert nach Einnahme von Chinidin

Duriles (R) bei der Bestimmung aus Blut.

Patient	6 Std.-Wert in $\mu\text{g/ml}$	Max.-Wert in $\mu\text{g/ml}$	$Q = \frac{6 \text{ Std.-Wert}}{\text{Max.-Wert}}$
1. ♀ 54 kg	1,62	1,62	1,00
2. ♂ 84 kg	2,16	2,88	0,75
3. ♀ 105 kg	0,76	0,76	1,00
4. ♀ 65 kg	1,32	1,32	1,00
5. ♂ 70 kg	1,15	1,61	0,714
6. ♂ 76 kg	1,96	2,08	0,942

Stat.
Berechnung

$\bar{x}$	1,49	1,71	0,90
S	0,52	0,71	0,13
$S \bar{x}$	0,21	0,29	0,05

Sechs-Stundenwert zu Maximalwert nach Einnahme von Chinidin
Duriles (R) bei der Bestimmung aus Kapillarblut.

Patient	6 Std.-Wert in $\mu\text{g/ml}$	Max.-Wert in $\mu\text{g/ml}$	$Q = \frac{6 \text{ Std.-Wert}}{\text{Max.-Wert}}$
1. ♀ 54 kg	4,1	4,1	1,00
2. ♂ 84 kg	1,25	1,85	0,675
3. ♀ 105 kg	1,15	1,40	0,821
4. ♀ 65 kg	1,21	1,21	1,00
5. ♂ 70 kg	1,17	2,00	0,585
6. ♂ 76 kg	1,62	1,67	0,970
Stat. Berechnung			
$\bar{x}$	1,75	2,03	0,84
S	1,16	1,05	0,17
S $\bar{x}$	0,47	0,42	0,07

e.) Vergleich des 6-Stundenwertes mit dem Maximalwert bei 6 Patienten, die Chinidinum purum Buchler^(R) $\Rightarrow$ 10 mg/kg Körpergewicht Chinidinbisulfat eingenommen hatten, in $\mu\text{g/ml}$ Plasma, Blut und Kapillarblut. Patient 7 bis 12.

Sechs-Stundenwert zu Maximalwert nach Einnahme von Chindin-
dinum purum Buchler ^(R) bei der Bestimmung aus Plasma.

Patient	6 Std.-Wert in µg/ml	Max.-Wert in µg/ml	$Q = \frac{6 \text{ Std.-Wert}}{\text{Max.-Wert}}$
7. ♂ 84 kg	3,18	4,15	0,766
8. ♂ 69 kg	1,21	3,80	0,318
9. ♂ 79 kg	2,41	2,41	1,00
10. ♂ 70,5"	3,01	3,01	1,00
11. ♀ 62 kg	1,97	4,09	0,481
12. ♂ 70 kg	1,21	2,49	0,485
Stat. Berechnung			
$\bar{x}$	2,16	3,32	0,67
S	0,85	0,79	0,29
$S_{\bar{x}}$	0,34	0,32	0,11

Sechs-Stundenwert zu Maximalwert nach Einnahme von Chindin-
dinum purum Buchler ^(R) bei der Bestimmung aus Blut.

Patient	6 Std.-Wert in µg/ml	Max.-Wert in µg/ml	$Q = \frac{6 \text{ Std.-Wert}}{\text{Max.-Wert}}$
7. ♂ 84 kg	2,88	3,88	0,742
8. ♂ 69 kg	1,10	2,94	0,374
9. ♂ 79 kg	1,61	1,61	1,00
10. ♂ 70,5"	2,54	2,54	1,00
11. ♀ 62 kg	1,28	2,55	0,501
12. ♂ 70 kg	1,24	2,90	0,427
Stat. Berechnung			
$\bar{x}$	1,77	2,73	0,67
S	0,75	0,73	0,28
$S_{\bar{x}}$	0,30	0,30	0,11

Sechs-Stundenwert zu Maximalwert nach Einnahme von Chini-
dinum purum Buchler (R) bei der Bestimmung aus Kapillarblut.

Patient	6 Std.-Wert in $\mu\text{g/ml}$	Max.-Wert in $\mu\text{g/ml}$	$Q = \frac{6 \text{ Std.-Wert}}{\text{Max.-Wert}}$
7. ♂ 84 kg	2,68	5,06	0,529
8. ♂ 69 kg	1,30	3,80	0,342
9. ♂ 79 kg	2,50	2,50	1,00
10. ♂ 70,5"	2,43	2,43	1,00
11. ♀ 62 kg	1,72	3,30	0,521
12. ♂ 70 kg	2,37	5,29	0,448
Stat. Berechnung			
$\bar{x}$	2,16	3,73	0,64
S	0,53	1,23	0,28
$S \frac{\bar{x}}{x}$	0,21	0,50	0,11

f.) Parameter der BATEMAN-Funktion bei 2 Patienten der Chinidinum-purum-Serie.

Bei 2 Patienten der Chinidinum-purum-Serie war es möglich, den Kurvenverlauf pharmakokinetisch genauer zu charakterisieren. Unter der (nicht bewiesenen) Annahme eines offenen linearen 1-Kompartiment-Modelles wurden die Parameter der BATEMAN-Funktion berechnet. Dies geschah unter Zuhilfenahme eines Programmes von Herrn Dr. Lies auf einem Olivetti Tischkomputer P 20/.

Die erhaltenen Werte sind auf Seite 31 und 32 zusammengestellt.

BATEMAN-Funktion bei Patient 8. ♂ 69 kg nach Einnahme von Chinidinum purum Buchler (R).

Patient 8. ♂ 69 kg	Best. Plasma	Best. Blut	Best. aus Kapbl.
$k_1 \text{ min.}^{-1}$	0,02192	0,02550	0,04086
$k_2 \text{ min.}^{-1}$	0,00345	0,00239	0,00239
$y_0 \text{ } \mu\text{g/ml}$	3,69338	2,55467	2,83534
$F_0 - \text{ } \mu\text{g/ml}^{-1} \text{ min.}$	902,12101	968,72970	1116,95000
$t_{\text{max. min.}}$	98,68543	101,02639	73,46600
$t_{0,5 \text{ min.}}$	200,91000	290,01970	290,01970

Erklärung der Symbole: k_1, k_2 = Geschwindigkeitskonstanten der Absorption bzw. Elimination.

y_0 = fictive Initialkonzentration.

F_0 = DoSt'sche Fläche.

$t_{\text{max.}}$ = Zeit des Maximums der BATEMAN-Funktion.

$t_{0,5}$ = Eliminationshalbwertszeit.

BATEMAN-Funktion bei Patient 12. ♂ 70 kg nach Einnahme von
Chinidinum purum Buchler (R).

Patient 12. ♂ 70 kg	Best. Plasma	Best. Blut	Best. aus Kapbl.
k_1 min. $^{-1}$	0,02635	0,02098	0,02983
k_2 min. $^{-1}$	0,00216	0,00306	0,00260
y_0 µg/ml	2,83950	3,99569	5,60400
F_0 - µg/ml $^{-1}$	1206,83000	1115,38000	618,77000
t_{max} min.	102,44000	106,28000	88,74000
$t_{0,5}$ min.	320,90100	226,51800	266,59000

Erklärung der Symbole: k_1 , k_2 = Geschwindigkeitskonstanten der
Absorption bzw. Elimination.

y_0 = fictive Initialkonzentration.

F_0 - = Dogt'sche Fläche

t_{max} = Zeit des Maximums der BATEMAN-Funktion.

$t_{0,5}$ = Eliminationshalbwertszeit.

D. Darstellung und Besprechung der Ergebnisse.

Ziel der Arbeit

1. Es sollte die Frage geklärt werden, ob die Doppel-extraktionsmethode von BRODIE, UDELMAN et al. (1947) in einer Modifikation von CFAMER und ISANSSON (1963) zur Bestimmung von Chinidin im Plasma geeignet ist, die Chinidinkonzentration auch aus Kapillarblut zu bestimmen. Bei aller Reserve gegenüber Kapillarblutbestimmungen sind sie doch besonders in der Pädiatrie oft nicht zu entbehren.

2. Es sollten mit der oben angegebenen Methode die Konzentrationsverhältnisse im Plasma (sowie gleichzeitig im Kapillarblut und venösen Blut) nach oraler Gabe von äquivalenten Dosen Chinidin Duriles^(R) (einer Retardform) und Chinidinum purum Buchler^(R) bestimmt werden.

Die Chinidinbestimmung wurde im Plasma, Blut und Kapillarblut durchgeführt und nach den heute üblichen Kriterien beurteilt.

Spezifität und Empfindlichkeit (untere Nachweisgrenze) konnten bei den Bestimmungen aus allen 3 Materialien als befriedigend beurteilt werden. Die Richtigkeit der Methode, beurteilt aus Zusatzversuchen mit 4 verschiedenen Konzentrationen lag bei einer Wiederfindungsrate von ca. 90 % und war bei den 3 Bestimmungsmethoden nicht signifikant verschieden. Die Abbildung Seite 46 zeigt, daß die Bestimmung des Chinidins aus Plasma und Venenblut mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,9 befriedigend korreliert. Dieser Korrelationskoeffizient wird wesentlich schlechter, wenn man die Bestimmungen aus Kapillarblut mit der aus Plasma bzw. Venenblut in Beziehung setzt. Dementsprechend nimmt auch die Punktschar der Meßwerte eine größere Korrelationsellipse ein und dokumentiert so die größere Streuung.

Es fällt auf, daß die Regressionsgeraden beim Vergleich von Plasma mit Venenblut bzw. Kapillarblut alle ein positives additives Glied besitzen, d.h. die y-Achse im positiven Bereich schneiden. Dies ist vorläufig nicht zu erklären, zumal der naheliegende Verdacht, es könnten im Extrakt aus Vollblut fluoreszenzlöschende Substanzen enthalten sein, nicht zutreffen kann, da in allen Fällen mit innerem Standard gearbeitet wurde.

Der positive Ordinatenabschnitt, der bedeutet, daß im Vollblut bzw. Kapillarblut die Konzentration des Chinidins kleiner ist als im Plasma, könnte so interpretiert werden, daß in den Erythrocyten weniger Chinidin enthalten ist als im Plasma. Diese Vermutung wurde durch G.SCHÜTTRUMPF (1969) bestätigt, die in Erythrocyten durchschnittlich 68 % der Chinidinkonzentration des Plasmaspiegels fand.

Schlußfolgerung für die Praxis:

Wenn auch die Bestimmung aus Kapillarblut die Fichtung der Konzentrationsänderung im Plasma häufig gut wiedergibt, so ist doch wegen der falschen Absolutwerte und der sehr viel größeren Streuung der Ergebnisse die Methode als nicht brauchbar zu bezeichnen. Man wird nach wie vor wegen der großen Streuung der Meßwerte bei der Bestimmung aus Blut, die Bestimmung aus Plasma als die Methode der Wahl bezeichnen müssen. Zur Gewinnung einer groben Übersicht ist die Kapillarblutmethode geeignet und könnte eventuell bei Notfällen in der Pädiatrie angewandt werden.

Ergebnisse.

Die Blutspiegelkurven von Chinidin nach oraler Gabe von 10 mg Chinidinbisulfat pro kg Körpergewicht in Form von Chinidin Duriles^(R) sind auf Tabelle Seite 19 sowie graphisch auf den Seiten 52 bis 57 dargestellt. Bei Patient 1 bis 4 wurden die Konzentrationen in Plasma, Blut und Kapillarblut jeweils nach 30, 60, 90, 120, 180 und 360 Minuten bestimmt. Bei Patient 5 und 6 zusätzlich eine Bestimmung nach 480 Min. durchgeführt. Alle Werte wurden durch einen inneren Standard ermittelt. Die Blutspiegelverläufe von Chinidin nach oraler Gabe von 10 mg Chinidinbisulfat in einer äquivalenten Menge Chinidinum purum Buchler^(R) pro kg Körpergewicht sind auf Tabelle Seite 21 sowie graphisch auf den Seiten 53, 56 sowie 58 bis 61 dargestellt. Bei Patient 7 bis 9 nach 30, 60, 90, 120, 180 und 360 Minuten, bei Pat. 10 bis 12 wurde zusätzlich eine Bestimmung nach 480 Min. durchgeführt.

Bei den Versuchspersonen, die Chinidin Duriles^(P) einnahmen, war der Maximalwert zwischen 2 und 6 Stunden erreicht, im Mittel nach 4,3 Std. Bei den Versuchspersonen die Chinidin purum Buchler^(R) eingenommen hatten war die maximale Konzentration nach 1 bis 6 Std. erreicht, im Mittel nach 3,5 Stunden.

Zur Beurteilung des Retardeffektes wurden 2 Parameter benutzt, einmal wurden die 6-Stundenwerte nach Einnahme von äquivalenten Mengen Chinidinbase verglichen. Dabei ergab sich für Chinidin purum ein Mittelwert von 2,2 µg/ml Plasma, für Chinidin Duriles^(R) ein solcher von 1,5 µg/ml.

Diese Mittelwerte sind nach dem t-Test nicht signifikant verschieden. Es kann demnach eine Retardierung aus dem Vergleich der Plasmawerte nach 6 Stunden nicht bewiesen werden. Als zweiter Parameter wurde das Verhältnis des 6-Std.-wertes zum Maximalwert gebildet. Dieser Quotient lag mit 0,83 für Chinidin Duriles^(R) etwas günstiger als für Chinidinum Buchler^(R) dessen Wert bei 0,67 lag. Man kann hier nur von einem Trend sprechen, da ebenfalls keine Signifikanz gegeben war. Eine Prüfung an einem größeren Patientengut wäre erforderlich.

E. Zusammenfassung.

Es wurde der Versuch unternommen, die Doppelextraktionsmethode nach BRODIE, UDEFRIED et al. (1947) in einer Modifikation von CPAMER und ISAKSSON (1963) zur Bestimmung von Chinidin im Plasma, auf Kapillarblut anzuwenden. Wenn gleich eine grobe Abschätzung der Chinidinkonzentrationen möglich ist, erscheint die Methode wegen eines systematischen Fehlers und zu geringer Präzision der erhaltenen Werte, nicht empfehlenswert.

In einem zweiten Teil der Arbeit wurden die Blutspiegel von Chinidin nach oraler Verabreichung von äquivalenten Dosen Chinidin Duriles^(R) (einem Depotpräparat) und Chinidinum purum Buchler^(R) untersucht. Dabei ließ sich der Retardierungseffekt für Chinidin Duriles^(R) nicht eindeutig beweisen. Wahrscheinlich führt die Retardform zu geringeren Spitzenspiegeln.

F. T a b e l l e n

Zahlenmaterial zur Linearität zwischen Chinidin Konzentration in 0,1 n Schwefelsäure und der im Aminco-Bowman-Spectrofluorimeter abgelesenen Skalenteile, bei einer Anregung von 340 nm und einer Fluoreszenz von 450 nm.

Keine exakte Linearität ergab sich in dem Bereich von 0,001 $\mu\text{g/ml}$ Chinidin (in 0,1 n Schwefelsäure) bis 0,01 $\mu\text{g/ml}$.

Einstellung 0,001 gemessen wurden Konzentrationen von 0,001 bis 0,01 $\mu\text{g/ml}$ Chinidin in 0,1 n H_2SO_4 . Noch keine Linearität!

Skalenteile

23	27	41	84
Konzentr. $\mu\text{g/ml}$			
0,001	0,0025	0,005	0,01

Einstellung 0,01 gemessen wurden Konzentrationen von 0,01 bis 0,1 $\mu\text{g/ml}$ Chinidin in 0,1 n H_2SO_4 . Linearität.

Skalenteile

7	18	35	53	68
Konzentr. $\mu\text{g/ml}$				
0,01	0,025	0,05	0,075	0,1

Einstellung 0,03 gemessen wurden Konzentrationen von 0,1 bis 0,4 $\mu\text{g/ml}$ Chinidin in 0,1 n H_2SO_4 . Linearität.

Skalenteile

23	49	75	99
Konzentr. $\mu\text{g/ml}$			
0,1	0,2	0,3	0,4

Einstellung 0,1 gemessen wurden Konzentrationen von 0,3 bis 1,3 $\mu\text{g/ml}$ Chinidin in 0,1 n H_2SO_4 . Linearität.

Skalenteile

23	30	38	44	52	60	65,5	75	82	85,5	93
----	----	----	----	----	----	------	----	----	------	----

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Einstellung 0,3 gemessen wurden Konzentrationen von
1,4 bis 4,8 $\mu\text{g/ml}$ Chinidin in 0,1 n H_2SO_4 . Linearität.

Skalenteile

32	34	37	39	41	43	45	46,5	48	51	52,5
----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	------

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skalenteile

54	56	58,5	62	64	65	67	68	70	72,5	75
----	----	------	----	----	----	----	----	----	------	----

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skalenteile

76	78	80	82	86	87	89	90	93	94	94,5
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skalenteile

96	98
----	----

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

4,7	4,8
-----	-----

In einer weiteren Verdünnungsreihe ebenfalls
Einstellung 0,3 gemessen wurden Konzentrationen von
1,6 bis 4,6 $\mu\text{g/ml}$ Chinidin in 0,1 n H_2SO_4 .

Skalenteile

34	38,5	42	46	49	54	58	60	65	67	72,5
----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

1,6	1,8	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skalenteile

75 78 82 85

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

4,0 4,2 4,4 4,6

Einstellung 1,0 gemessen wurden Konzentrationen von
5,5 bis 10,0 $\mu\text{g/ml}$ Chinidin in 0,1 n H_2SO_4 .

Skalenteile

31 34,5 37 40 42 43,5 47,5 55

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 10,0

Einstellung 1,0 gemessen wurden Konzentrationen von
2,4 bis 10,0 $\mu\text{g/ml}$ Chinidin in 0,1 n H_2SO_4 in einer
anderen Verdünnungsreihe.

Skalenteile

14 15 17 18 19 20 22,5 24,5 25,5 27,0

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

Skalenteile

29 30 31,5 33 36 39,5 43,0 45,0 47,2 49,7

Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

4,4 4,6 4,8 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

Skalenteile

54,5 56 63


Konzentr. $\mu\text{g/ml}$

8,5 9,0 10,0

Graphische Darstellung der Linearität zwischen Chinindinkonzentration in 0,1 n Schwefelsäure und der am Aminco- Bowmann- Spectrofluorimeter abgelesenen Skalenteile, bei einer Anregung von 340 nm und einer Fluoreszenz von 450 nm.


Skalenteile

Einstellung μpH



Skalentafel

Einstellung d1



Skalentitel


Einstellung 1

63


24

24


mg 1000/ml Chinidin im 0,1N H_2SO_4



Korrelation der Chinidinkonzentrationen zwischen
Plasma und Venenblut.



Korrelation der Chinidinkonzentrationen zwischen
Plasma und Kapillarblut.



Korrelation der Chinidinkonzentrationen zwischen
Venenblut und Kapillarblut.



Graphische Darstellung des Konzentrationsverlaufes (mit Regressionsformeln vom Typ $y = a + b \cdot x$) bei den Bestimmungen aus Plasma und Kapillarblut nach Einnahme von 10 mg Chinidinbisulfat pro kg Körpergewicht.

Patient 1 bis 6 nach Einnahme von Chinidin Duriles^(p), Patient 7 bis 12 nach Einnahme von Chinidin purum Buchler^(R).

Bei Patient 2 und 7 handelt es sich um eine Versuchsperson, die sowohl Chinidin Duriles^(R) als auch Chinidin purum Buchler^(R) einnahm. Dasselbe gilt für Patient 5 und 8.

Bei diesen beiden Versuchspersonen (2/7 und 5/8) wurden die Konzentrationsverhältnisse nach Einnahme von Chinidin Duriles^(R) sowie Chinidin purum Buchler^(p) auf einem Diagramm aufgezeichnet.

1. Pat. ♀ 48 J. 54 kg

CHINIDIN DURILES

Dosis: 540 mg Chinidinbissulfat

Kapillarkblut

Plasma

$\mu\text{g/ml}$

$10^1 \cdot 10$

$10^0 \cdot 1$

60 Stunden

3,0

2,0

1,5

1,0

0,5

7

6

5

4

3

2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15


2 Pat. ♂ 30 J. 84 kg
CHINIDIN DURTLES

7 Pat. ♂ 30 J. 84 kg
CHINIDIN PURUM

Dosis: 840 mg Chinidinbissulfat
Kapillärblut
Plasma

Dosis: 523 mg Chinidin purum 2 840 mg
Chin bis.
Kapillärblut
Plasma

µg/ml



Stunden

3. Pat. ♀ 42 J. 105 kg

CHINIDIN DURILES

Dosis: 1050 mg Chinidinbissulfat

Kapillarblut

Plasma

$\mu\text{g/ml}$

10^1

8

7

6

5

4

3

2

1

10^0

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-1}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-2}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-3}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-4}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-5}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-6}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-7}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-8}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-9}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-10}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-11}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-12}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-13}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-14}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-15}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-16}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-17}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-18}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-19}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-20}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-21}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-22}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-23}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-24}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-25}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-26}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-27}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-28}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-29}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-30}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-31}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-32}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-33}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-34}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-35}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-36}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-37}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-38}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-39}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-40}

8

7

6

5

4

3

2

1

10^{-41}

8

7

6

5

4

3

2

1

4 Pat. 837, 65 kg

CHINIDIN DURILES

Dosis: 650 mg Chinidinbifulfat

Kapillärblut

Plasma

µg/ml

10¹

10⁰

10⁻¹

10⁻²

10⁻³

10⁻⁴

10⁻⁵

10⁻⁶

10⁻⁷

10⁻⁸

10⁻⁹

10⁻¹⁰

10⁻¹¹

10⁻¹²

10⁻¹³

10⁻¹⁴

10⁻¹⁵

10⁻¹⁶

10⁻¹⁷

10⁻¹⁸

10⁻¹⁹

10⁻²⁰

10⁻²¹

10⁻²²

10⁻²³

10⁻²⁴

10⁻²⁵

10⁻²⁶

10⁻²⁷

10⁻²⁸

10⁻²⁹

10⁻³⁰

10⁻³¹

10⁻³²

10⁻³³

10⁻³⁴

10⁻³⁵

10⁻³⁶

10⁻³⁷

10⁻³⁸

10⁻³⁹

10⁻⁴⁰

10⁻⁴¹

10⁻⁴²

10⁻⁴³

10⁻⁴⁴

10⁻⁴⁵

10⁻⁴⁶

10⁻⁴⁷

10⁻⁴⁸

10⁻⁴⁹

10⁻⁵⁰

10⁻⁵¹

10⁻⁵²

10⁻⁵³

10⁻⁵⁴

10⁻⁵⁵

10⁻⁵⁶

10⁻⁵⁷

10⁻⁵⁸

10⁻⁵⁹

10⁻⁶⁰

10⁻⁶¹

10⁻⁶²

10⁻⁶³

10⁻⁶⁴

10⁻⁶⁵

10⁻⁶⁶

10⁻⁶⁷

10⁻⁶⁸

10⁻⁶⁹

10⁻⁷⁰

10⁻⁷¹

10⁻⁷²

10⁻⁷³

10⁻⁷⁴

10⁻⁷⁵

10⁻⁷⁶

10⁻⁷⁷

10⁻⁷⁸

10⁻⁷⁹

10⁻⁸⁰

10⁻⁸¹

10⁻⁸²

10⁻⁸³

10⁻⁸⁴

10⁻⁸⁵

10⁻⁸⁶

10⁻⁸⁷

10⁻⁸⁸

10⁻⁸⁹

10⁻⁹⁰

10⁻⁹¹

10⁻⁹²

10⁻⁹³

10⁻⁹⁴

10⁻⁹⁵

10⁻⁹⁶

10⁻⁹⁷

10⁻⁹⁸

10⁻⁹⁹

10⁻¹⁰⁰

10⁻¹⁰¹

10⁻¹⁰²

10⁻¹⁰³

10⁻¹⁰⁴

10⁻¹⁰⁵

10⁻¹⁰⁶

10⁻¹⁰⁷

10⁻¹⁰⁸

10⁻¹⁰⁹

10⁻¹¹⁰

10⁻¹¹¹

10⁻¹¹²

10⁻¹¹³

10⁻¹¹⁴

10⁻¹¹⁵

10⁻¹¹⁶

10⁻¹¹⁷

10⁻¹¹⁸

10⁻¹¹⁹

10⁻¹²⁰

10⁻¹²¹

10⁻¹²²

10⁻¹²³

10⁻¹²⁴

10⁻¹²⁵

10⁻¹²⁶

10⁻¹²⁷

10⁻¹²⁸

10⁻¹²⁹

10⁻¹³⁰

10⁻¹³¹

10⁻¹³²

10⁻¹³³

10⁻¹³⁴

10⁻¹³⁵

10⁻¹³⁶

10⁻¹³⁷

10⁻¹³⁸

10⁻¹³⁹

10⁻¹⁴⁰

10⁻¹⁴¹

10⁻¹⁴²

10⁻¹⁴³

10⁻¹⁴⁴

10⁻¹⁴⁵

10⁻¹⁴⁶

10⁻¹⁴⁷

10⁻¹⁴⁸

10⁻¹⁴⁹

10⁻¹⁵⁰

10⁻¹⁵¹

10⁻¹⁵²

10⁻¹⁵³

10⁻¹⁵⁴

10⁻¹⁵⁵

10⁻¹⁵⁶

10⁻¹⁵⁷

10⁻¹⁵⁸

10⁻¹⁵⁹

10⁻¹⁶⁰

10⁻¹⁶¹

10⁻¹⁶²

10⁻¹⁶³

10⁻¹⁶⁴

10⁻¹⁶⁵

10⁻¹⁶⁶

10⁻¹⁶⁷

10⁻¹⁶⁸

10⁻¹⁶⁹

10⁻¹⁷⁰

10⁻¹⁷¹

10⁻¹⁷²

10⁻¹⁷³

10⁻¹⁷⁴

10⁻¹⁷⁵

10⁻¹⁷⁶

10⁻¹⁷⁷

10⁻¹⁷⁸

10⁻¹⁷⁹

10⁻¹⁸⁰

10⁻¹⁸¹

10⁻¹⁸²

10⁻¹⁸³

10⁻¹⁸⁴

10⁻¹⁸⁵

10⁻¹⁸⁶

10⁻¹⁸⁷

10⁻¹⁸⁸

10⁻¹⁸⁹

10⁻¹⁹⁰

10⁻¹⁹¹

10⁻¹⁹²

10⁻¹⁹³

10⁻¹⁹⁴

10⁻¹⁹⁵

10⁻¹⁹⁶

10⁻¹⁹⁷

10⁻¹⁹⁸

10⁻¹⁹⁹

10⁻²⁰⁰

10⁻²⁰¹

10⁻²⁰²

10⁻²⁰³

10⁻²⁰⁴

10⁻²⁰⁵

10⁻²⁰⁶

10⁻²⁰⁷

10⁻²⁰⁸

10⁻²⁰⁹

10⁻²¹⁰

10⁻²¹¹

10⁻²¹²

10⁻²¹³

10⁻²¹⁴

10⁻²¹⁵

10⁻²¹⁶

10⁻²¹⁷

10⁻²¹⁸

10⁻²¹⁹

10⁻²²⁰

10⁻²²¹

10⁻²²²

10⁻²²³

10⁻²²⁴

10⁻²²⁵

10⁻²²⁶

10⁻²²⁷

10⁻²²⁸

10⁻²²⁹

10⁻²³⁰

10⁻²³¹

10⁻²³²

10⁻²³³

10⁻²³⁴

10⁻²³⁵

10⁻²³⁶

10⁻²³⁷

10⁻²³⁸

10⁻²³⁹

10⁻²⁴⁰

10⁻²⁴¹

10⁻²⁴²

10⁻²⁴³

10⁻²⁴⁴

10⁻²⁴⁵

10⁻²⁴⁶

10⁻²⁴⁷

10⁻²⁴⁸

10⁻²⁴⁹

10⁻²⁵⁰

10⁻²⁵¹

10⁻²⁵²

10⁻²⁵³

10⁻²⁵⁴

10⁻²⁵⁵

10⁻²⁵⁶

10⁻²⁵⁷

10⁻²⁵⁸

10⁻²⁵⁹

10⁻²⁶⁰

10⁻²⁶¹

10⁻²⁶²

10⁻²⁶³

10⁻²⁶⁴

10⁻²⁶⁵

10⁻²⁶⁶

10⁻²⁶⁷

10⁻²⁶⁸

10⁻²⁶⁹

10⁻²⁷⁰

10⁻²⁷¹

10⁻²⁷²

10⁻²⁷³

10⁻²⁷⁴

10⁻²⁷⁵

10⁻²⁷⁶

10⁻²⁷⁷

10⁻²⁷⁸

10⁻²⁷⁹

10⁻²⁸⁰

10⁻²⁸¹

10⁻²⁸²

10⁻²⁸³

5 Pat. ♂ 28 J. 70 kg

CHINIDIN DURILES

Dosis: 700 mg Chinidinbissulfat

Kapillarblut

Plasma

8 Pat. ♂ 28 J. 69 kg


CHINIDIN PURUM

Dosis: 429 mg Chinidin purum $\approx$ 690 mg

Kapillarblut

Plasma

$\mu\text{g/ml}$



8.0 Stunden


6 Pat. ♂ 24 J. 76 kg

CHINIDIN DURILES

Dosis: 760 mg Chinidinbissulfat

Kapillarblut

plasma



9. Pat. ♂ 37 J. 19 kg

CHINIDIN PURUM

Dosis: 492 mg Chinidin purum $\approx$ 790 mg Chinidinb-sulfat

Kapillarb-lut

Plasma

$\mu\text{g/ml}$

10^1

9

8

7

6

5

4

3

2

10^0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

6,0

Stunden

Stunden

1
10
1

10. Pat. ♂ 42 J. 70.5 kg

CHINIDIN PURUM

Dosis: 429 mg Chinidin purum $\hat{=}$ 705 mg Chinidinbissulfat

Kapillarbblut

Plasma

$\mu\text{g/ml}$



11. Pat. ♀ 25 J. 62 kg


CHINIDIN PURUM

Dosis: 386 mg Chinidin purum Δ 620 mg Chinidinbisulfat

Kapillärblut

Plasma

$\mu\text{g/ml}$



12. Pat ♂ 23 J. 70 kg

CHINIDIN PURUM

Dosis: 436 mg Chinidin purum $\pm$ 100 mg Chinidinbisulfat

Kapillarblut

Plasma

$\mu\text{g/ml}$

10^4

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10^3

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8,0 Stunden

6,0

3,0

2,0

1,5

1,0

0,5

1 81 1

7

6

5

4

3

2

1

10^3

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Literaturverzeichnis

1. Armitage, A.K.: The Influence of Potassium Concentration on the Action of Quinidine and of Some Antimalarial Substances on Cardiac Muscle.
Brit. J. Pharmacol. 12, 74, 1957
2. Brodie, B.B., S. Udenfriend & J.E. Baer: The Estimation of Basic Organic Compounds in Biological Material.
I. General Principles.
J. Biol. Chem. 168, 299, 1947
3. Brodie, B.B., S. Udenfriend, W. Dill & G. Downing: The Estimation of Basic Organic Compounds in Biological Material.
II. Estimation of Fluorescent Compounds.
J. Biol. Chem. 168, 311, 1947
4. Conn, H.L. & R.J. Luchi: Some Quantitative Aspects of the Binding of Quinidine and Related Quinidine Compounds by Human Serum Albumin.
J. Clin. Invest. 40, 509, 1961
5. Conn, H.L.: Quinidine as an Antiarrhythmic Agent. Basic and Clinical Considerations. Advances in Cardiopulmonary Diseases II, 286, 1964
6. Cromér, G. & B. Jsaksson: Quantitative Determination of Quinidine in Plasma.
Scand. J. Clin. Lab. Invest. 15, 553, 1963

7. Cullhed, U., A. Hamfelt & E. Malers: Serum Quinidine Concentration with Two Long-acting Quinidine Preparations.
Acta Med. Scand. 179, 401, 1966
8. Dawes, G.S.: Synthetic Substitutes for Quinidine.
Brit. J. Pharmacol. 1, 90, 1946
9. Ferrer, M.J., R.M. Harvey, L. Werkö, D.T. Dresdale, A. Cournand & D.W. Richards: Some Effects of Quinidine Sulfate on the Heart and Circulation in Man.
Am.Heart J. 36, 816, 1948
10. Hiatt, E., D. Brown, G. Quinn & K. Mac Duffie: The Blocking Action of the Cinchona Alkaloid and Certain Related Compounds on the Cardioinhibitory Vagus Endings of the Dog.
J. Pharmacol. & Exper. Therap. 85, 55 1945
11. Holland, W.C.: A Possible Mechanism of Action of Quinidine.
Am. J. Physiol. 190, 492, 1957
12. Raabe, P.: Synthese des Dihydrochinins 1931
13. Siitonen, L.: Quinidine Preparations of Prolonged Action.
Duodecim 80, 686, 1964
14. Sjögren, J.: Laboratory Control of Duretter (R), a Sustained Release Tablet.
Dansk T. Farm. 94, 189, 1960

15. Sokolow, M.: Interrelationships between Dose, Serum Concentration and Toxicity in the Treatment of Atrial Fibrillation with Quinidine. *Circ.* 14, 1003, 1950
16. Sokolow, M.: The Present Status of Therapy of the Cardiac Arrhythmias with Quinidine. *Am. Heart J.* 42, 771, 1951
17. Sokolow, M. & Ball, R.E.: Factors influencing Conversion of chronic Atrial Fibrillation with special Reference to Serum Quinidine Concentration. *Circ.* 14, 568, 1956
18. Vaughan-Williams, E.M.: The Mode of Action of Quinidine in Isolated Rabbit Atria Interrupted from Intracellular Potential Records. *Brit. J. Pharmacol.* 13, 276, 1958
19. Weidmann, S.: Effects of Calcium Ions and Local Anesthetics on the Electrical Properties of Purkinje Fibers. *Am. J. Physiol.* 129, 568, 1955
20. Schüttertrumpf, G.: Über die Verteilung des Chinidins im menschlichen und tierischen Organismus. Inaugural-Dissertation, Heidelberg 1969 S.30.

Zum Schluß danke ich Herrn Professor Dr. med. H.J. Dengler für die freundliche Überlassung des Themas sowie für seine wertvollen Anregungen und die mir jederzeit gewährte Hilfe bei der Durchführung dieser Arbeit.



Lebenslauf

12.9.1936 in Stuttgart als zweiter Sohn des Apothekers Karl Dieterich und seiner Ehefrau Margarete Dieterich, geb. Heinzerling, geboren.

27.2.1956 Zeugnis der Reife am Wagenburg-Gymnasium Stuttgart, Englisch erste Pflichtfremdsprache (9 Jahre), Latein zweite Pflichtfremdsprache (7 Jahre).

1.4.1956 bis 27.4.1961 Studium der Pharmazie an der Universität Tübingen.

30.4.1962 Bestallung als Apotheker.

1.5.1962 bis 31.10.1963 als Apotheker in einer öffentlichen Apotheke.

1.11.1963 bis 14.12.1968 Studium der Medizin an der Ruprecht-Karl-Universität zu Heidelberg.

14.12.1968 medizinisches Staatsexamen Heidelberg.

15.12.1968 bis 30.6.1969 Versorgung meiner beiden Kinder (geb. 1965 und 1966), die aus der Ehe mit der Studentin der Medizin Inge Dieterich, geb. Steinbronn, hervorgegangen waren. Meine Frau legte in dieser Zeit die ärztliche Prüfung in Heidelberg ab.

1.7.1969 bis 15.7.1970 Medizinalassistent im Kreis-krankenhaus Burgdorf (bei Hannover), 8 Monate Chirurgie, 4 1/2 Monate Innere Medizin.

30.6.1970 Approbation als Arzt.

16.7.1970 bis 31.12.1971 Assistentsarzt an der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung des Kreiskrankenhauses Reutlingen.

Seit 1.1.1972 als Assistentsarzt an der Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses Reutlingen tätig.

1973 möchte ich mich als prakt. Arzt in einer kleineren Gemeinde bei Reutlingen niederlassen.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the progress of the work.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work in the field and the second section deals with the results of the work in the laboratory.

3. The third part of the report deals with the conclusions drawn from the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions drawn from the work in the field and the second section deals with the conclusions drawn from the work in the laboratory.

4. The fourth part of the report deals with the recommendations made during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the recommendations made in the field and the second section deals with the recommendations made in the laboratory.

5. The fifth part of the report deals with the summary of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the summary of the work in the field and the second section deals with the summary of the work in the laboratory.

FOTO-DRUCK LENZ · 63 Gießen · Riegelpfad 32/Ecke Ludwigstraße
Telefon 0641 - 77449